

ULUSAL AŞI TAKVİMİ VE TAKVİM DIŞI AŞILARIN UYGULAMA ÖNERİLERİ

ULUSAL AŞI TAKVİMİ

Ay/Yaş

	Doğumda	1. Ay	2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay	6. Ay	7. Ay	8. Ay	9. Ay	10. Ay	11. Ay	12. Ay	18. Ay	24. Ay	İlköğretim 1. Sınıf	İlköğretim 8. Sınıf
Hepatit B Aşısı	I	II					III										
Verem Aşısı			I														
Konjuge Pnömonokok Aşısı			I		II								R				
DaBT-İPA-Hib Aşısı			I		II		III							R			
Oral Polio Aşısı							I							II			
Suçiçgeği Aşısı													I				
KKK Aşısı													I			II	
Hepatit A Aşısı														I	II		
DaBT-İPA																R	
Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı																	R

ULUSAL AŞI TAKVİMİ DIŞINDAKİ AŞILAR

Ay/Yaş

		2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay	6. Ay	7. Ay	8. Ay	9. Ay	10. Ay	11. Ay	12-13.ay	18.ay	24.ay	İlköğretim 1. Sınıf	İlköğretim 8. Sınıf
MENİNGOKOK AŞILARI	6. Aydan küçük bebekler	MenACWY-TT*	1. DOZ	2. DOZ								RAPEL				
		MenACWY-CRM**	1. DOZ	2. DOZ	3. DOZ							RAPEL				
		4CMenB***	1. DOZ	2. DOZ	3. DOZ							RAPEL				
	6. Aya kadar aşılanmadıysa	MenACWY-TT*				1. DOZ						RAPEL				
		MenACWY-CRM**				1. DOZ						RAPEL				
		MenACWY-DT***						1. DOZ				RAPEL				
		4CMenB****				1. DOZ	1. DOZ					RAPEL				
	12. Aya kadar aşılanmadıysa (24 aya kadar)	MenACWY-TT*										1 DOZ				
		MenACWY-CRM**										2 DOZ				
		MenACWY-DT***										2 DOZ				
		4CMenB****										2 DOZ + RAPEL				
	≥ 24. Aya kadar aşılanmadıysa	MenACWY-TT*													1 DOZ	
		MenACWY-CRM**													1 DOZ	
		MenACWY-DT***													1 DOZ	
		4CMenB****													2 DOZ	
ROTAVİRÜS AŞILARI	6-14 Hafta arası bebekler	Monovalan Rotavirüs Aşısı	1. DOZ	2. DOZ												
		Pentavalan Rotavirüs Aşısı	1. DOZ	2. DOZ	3. DOZ											
HPV AŞILARI	9-14 Yaş arası çocuklar															2 DOZ ¹

* Nimenrix®; Her iki doz arasında en az 2 ay bırakılmalıdır. 1 yaş ve üzeri üst yaş sınırı olmaksızın tek doz olarak uygulanmaktadır.

** Menveo®; Her iki doz arasında en az 2 ay bırakılmalıdır. 2 yaş ve üzeri üst yaş sınırı olmaksızın tek doz olarak uygulanmaktadır.

*** Menactra™; Her iki doz arasında en az 3 ay bırakılmalıdır. 2-55 yaş arası bireylerde tek doz olarak uygulanmaktadır.

**** Bexsero®; 2- 5 yaş arası bebeklerde primer dozlar arasında her iki doz arasında en az 1 ay, 6-23 aylık aşılanmamış bebeklerde primer dozlar arasında her iki doz arasında en az 2 ay bırakılmalıdır. 2- 10 yaş arası çocuklarda her iki doz arasında en az 2 ay bırakılmalıdır.

¹ Gardasil® veya Cervarix®; 9-13 yaş arası bireyler HPV Aşısı 2 doz aşılama şeması şeklinde uygulanabilir (0. ve 6. ayda 0.5 ml)

² 4. aydan sonra gelen bebeğe 2 ay kaydırılarak aynı takvim uygulanır.

³ Rotarix® (Monavalan), Rotateq® (Pentavalan); Rotavirüs aşısı için 1. dozunun 14. haftadan sonraya; son dozunun da 32. hafta sonrasına bırakılmaması gerekir.

Genel Öneriler

- İmmün yetmezli çocuklarda canlı aşilar yapılmamalıdır. Buna ek olarak, OPV (Oral Polio Aşısı) aynı evdeki aile bireylerine de yapılmamalıdır.
- MenB aşısıyla MenACWY aşısı aynı anda yapılabilir.
- Aşı öncesi antipiretik kullanımı genel bir öneri değildir. Ancak yüksek ateş yapan aşılarla birlikte kullanılabilir.